

脱ステ後は全身性に悪化 食事・漢方等に取り組むが余り効果がなかった。

27歳 H25.6.3～8.25入院

乳幼児期から湿疹 学童期 四肢屈曲部にアトピー性皮膚炎が生じたが市販の保湿クリームで対処 中学時代に近医受診しプロトピックを 四肢屈曲部 顔 頸部を中心に全身に使用 その後、高校ではステロイド軟膏も一時期使用 高校2年 脱ステする 全身性に悪化 脱ステ後は食事・漢方等に取り組むが余り効果がなかった。悪いながらもバイトしながら生活している。 ここ4、5年は春から夏に悪化する傾向がある。2013.6.3入院

経過 BST の入浴時間も長く 熱心に取り組んでマーカーも自覚症状もスムーズに改善しています。 美容も取り入れ 女子力アップ 自宅でBST 継続しています。皮膚炎が改善すると写真でも判るように皮膚の正常構造が回復し 皮膚に本来の張り と弾力性が戻ってきます。

	基準値範囲	2013/6/4	2013/7/3	2013/8/3	2013/8/19
TARC	450 以下	4297	1023 ↓	748 ↓	363 ↓
LDH	120～245	404	305 ↓	231 ↓	217 ↓
IgE	170 以下	3306	3353	2372 ↓	2370
好酸球	7%以下	25	9.7 ↓	12.6	8.6 ↓
POEM 自覚症	最重症 20～28	24	19 ↓	3 ↓	6





