

妊婦さんのケース 27才 入院 2012.2.17～5.6 2012.秋 出産

23歳頃から赤み・痒みが顔 肘 腹部に生じるようになり近医皮膚科にてステロイド外用治療開始 特に冬季になると悪化していた。

1年前に結婚した。妊娠希望もあり40日前から脱ステしたが1か月前から皮膚炎が悪化 全身性に皮膚炎が生じ 発赤 痒み 滲出液も出るようになり夜間も眠れなくなった。10日前妊娠が分かったがステロイドも使えず そう痒も我慢できない状態で2012.2.17入院、BSTを始めた。

IgEが上昇しないタイプのアトピー性皮膚炎ですがBSTによく反応しています。TARCは2カ月で10分の1に低下 妊娠中では内服も外用ステロイドも使用しにくいいため、BSTを使用せざるを得ないケースは多いと思われます。このケースも退院後も入浴療養を継続し無事出産した。妊娠後期の破水や出産直後の産褥期は2週間程度はBSTを控えた方が良いのではないかと考えます。

	正常値	2012.2.14	2.24	3.8	4.17
TARC	450以下	6317	—	1533 ↓	664 ↓
LDH	120～245	338	303	239 ↓	219 ↓
IgE	170以下	13	—	22	22
好酸球	7%以下	22.0	15.9 ↓	9.7 ↓	7.0 ↓

2/17



5/3

